

5. 予防接種と薬

(1) 予防接種について

<入国に際して必要とされる予防接種はありません。>

・必要な予防接種

◎ 強く ○ できれば △ 感染危険地帯・医療過疎地旅行時

成人：◎破傷風、◎A型肝炎、◎B型肝炎、○日本脳炎、○腸チフス、△狂犬病

○MMR（麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、30才前後で免疫の低下した人が多い）

小児：

日本の定期接種

◎DPT [ジフテリア・百日せき・破傷風]、◎ポリオ、◎麻疹 [はしか]

◎風疹、◎日本脳炎、◎BCG

日本の任意接種：

◎A型肝炎（米国では1才から、日本では16才から）、◎B型肝炎、◎水痘

○Hib ○流行性耳下腺炎、○インフルエンザ、○腸チフス、△狂犬病、

△肺炎球菌

狂犬病ワクチンは、予防注射を3回受けていても、犬に噛まれたら、再度病院を受診し注射（3-4回）を受けて下さい。事前に予防接種を受けていない場合には、犬等に咬まれて24時間以内に血清かワクチン接種が必要です。その後、6回の注射または、血清治療が必要です。詳しくは、保健所か医療機関に相談してください。

(2) 現地の小児定期予防接種一覧 [カンボジア人]

	初回	2回目	3回目	4回目
BCG	出生直後			
ポリオ（経口） DTP, Hib	生後6週	生後10週	生後14週	
MMR	9ヶ月			
B型肝炎	出生直後	生後6週	生後10週	生後14週

<注> Hib : インフルエンザ菌b型、MMR : 麻疹、流行性耳下腺炎、風疹

・現地校に入学・入園する際に必要な予防接種・接種証明はありません。

インターナショナルスクールでは、親が記載する予防接種記録の提出が必要な場合があります。未実施の場合には接種を勧められることがあります。

<注>予防接種に関する詳細、Q&Aは、
<http://www.wakutin.or.jp> 社団法人細菌製剤協会 で確認して下さい。
日本脳炎ワクチンは外国では手に入りにくく高額です。
その他のワクチンは、ホームページ記載のプライベートクリニックで接種可能です。

(2) 薬について

町中の薬局では、痛み止め、下痢止め、抗生物質、胃腸薬などほとんどの薬を処方箋なしで買うことができますが、偽物の薬も混ざっていることがあります。
また、現地の薬は、日本の 2 倍以上の容量があることが多く、その分副作用も強く、剤型も大きくて飲みにくいです。

・比較的安心できる薬局

PHARMACIE DE LA GARE

No.81 Blvd. Preah Monivong Phnom Penh (旧鉄道の中央駅前広場角)

Tel:+855-23-430205 Tel:+855-12-805908

・どのような薬を持参すると便利か

普段使用している常備薬、総合感冒薬、下痢止め、解熱鎮痛薬、うがい薬
湿布薬、下痢をした時に飲むスポーツドリンクの粉末、など。

(なお、最近は、ポカリスエットのボトルがスーパーで買えるようになりました。)